

『不動産のための計量分析』レジュメ N0.7

クラス担当教員名※1	学部・学科名	学籍番号※2	氏名※2	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

5. 重回帰分析

5.1 重回帰分析とは


経済変数間の関数関係は、2組だけの変数だけで記述できるわけではありません。ミクロ経済でも習ったように、需要を変化させる要因は価格以外に様々なものが考えられます。例えば、うどんの需要はうどんの価格以外に、所得や代替財のそばの価格や補完財のネギの価格などの要因があります。

このように、説明変数が2つ以上の場合を**重回帰分析**と言います。基本的な考え方は単回帰分析と一緒です。変数y（例えば、うどんの需要量）がk個の変数x₁（例えばうどん価格）、x₂（所得）x₃（そばの価格）、…、x_kと関係しているとして

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k \quad (1)$$

のように、定数(β₀)とx₁, x₂, x₃, …, x_kの線形式で表されるとします。これを、「yを定数とx₁, x₂, x₃, …, x_kに重回帰する」と言い、この線形式を**重回帰式(重回帰方程式)**と言います。重回帰式でβ₀を定数項、β₁, …, β_kを**回帰係数(偏回帰係数, 母回帰係数)**と言います(後述のように、**回帰係数**β_iが他の変数が一定でx_iだけが1単位増加したときのyの増加量を示すから)。

図 5-1 重回帰方程式と残差



5.2 重回帰式の推計

単回帰と同様に、(以下の式とはばしても構いません。大学院に行こうという学生のみよく見てください。)

$$s(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{1i} - \dots - \beta_k x_{ki})^2 \quad (2)$$

を最小にするβ₀, β₁, …, β_kを求めます(で、単回帰と同様に**最小二乗法**といいます)。ようするに、最小二乗法から求められる回帰係数は、上図で、回帰平面で求められる**理論値(あてはまり値)**と**観測値**の距離(残差)の合計を最短にします。

定数項と回帰係数はs(β₀, β₁, …, β_k)をβ₀, β₁, …, β_kで偏微分し、ゼロとすると、k + 1本の式(正規方程式)から求めます。

$$\begin{aligned} b_0 \sum_{i=1}^n 1 + b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i} + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki} &= \sum_{i=1}^n y_i \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{1i} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i}^2 + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{1i} x_{ki} &= \sum_{i=1}^n x_{1i} y_i \\ &\dots \dots \dots \\ b_0 \sum_{i=1}^n x_{ki} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i} x_{ki} + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki}^2 &= \sum_{i=1}^n x_{ki} y_i \end{aligned}$$

この正規方程式はk + 1個の未知数でk + 1本の連立方程式であるので解が得られる条件は説明変数x₁, x₂, …, x_kと定数1に一次従属の関係がないことです。一次従属の場合は多重共線の関係と言います。単回帰のように簡単な式で解を示すことは出来ませんが、最初の式をnで割ると、以下のように各変数のデータの平均を通ることが分かります。

$$\bar{y} = b_0 + \beta_1 \bar{x}_1 + \dots + \beta_k \bar{x}_k \quad (3)$$

『不動産のための計量分析』レジュメ NO.7

クラス担当教員名※1	学部・学科名	学籍番号※2	氏名※2	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

5.3 重回帰式のあてはまり

重回帰式のあてはまりも単回帰と同じような考えです。

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_{i1} + \dots + b_k x_{ik} \quad (4)$$

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (5)$$

重回帰式の特徴

- ① 平均 $(\bar{y}, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_k)$ を通る。
- ② 残差の総和、平均は0。
- ③ 残差と説明変数は直交する

重回帰式でも、下式は成立します。

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad (6)$$

全変動 = 回帰変動 + 残差変動

決定係数 $R^2 = \frac{\text{回帰変動}}{\text{全変動}}$

しかし、ここでこのまま**決定係数**を用いると問題があります。残差変動を $RSS(k)$ とすると

$$R^2(k) = 1 - \frac{RSS(k)}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (7)$$

となります。ここで、説明変数を1個追加すると、残差変動は $RSS(k+1)$ となり、 $RSS(k+1) = \min S(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k, \beta_{k+1}) \leq \min S(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k, 0) = RSS(k)$ から $R^2(k) \leq R^2(k+1)$ となります。**ようするに、これは被説明変数と何の関係もない変数を説明変数に追加しても決定係数が上がることになります(ここだけ理解してください)。**

そこで、

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2 / (n-k-1)}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 / (n-1)} \quad (8)$$

で表される、**説明変数の個数を与える影響を考慮した決定係数である自由度修正決定係数(\bar{R}^2)**を使います。ここで、 k は説明変数の数。自由度修正とは決定係数の定義において残差変動と全変動の比をそれぞれの自由度 $(n-k-1)$ 、 $(n-1)$ で割った平均変動の比に置き換えたもの。残差変動は必ずしも減少せず、全変動の値は説明変数の追加、除去と無関係。説明変数の追加、除去の判断には \bar{R}^2 を使います。

5.4 Excelによる重回帰分析

さて、重回帰分析は単回帰分析のように表から簡単に計算できるものではありません。以後は、Excelのアドインソフトの一つの分析ツールを用いて重回帰分析を行っていきます。

表5-1は新浦安駅周辺のコンビニ各店の売り上げと店舗の特性です。1日あたりの売り上げ (y) は店舗面積と駅からの距離と関係があるかを**回帰分析**で調べてみましょう。

表 5-1 新浦安駅周辺のコンビニの売り上げ

店舗	一日平均売上高	店舗面積	駅からの距離
	万円 y	m^2 x_1	100m x_2
A	4.0	6.0	3
B	4.5	10.0	5
C	8.0	8.5	2
D	6.0	5.0	1
E	5.0	7.5	3
F	2.0	5.5	4
G	1.5	7.0	6
H	9.0	9.5	1
I	3.0	4.5	3
J	7.0	6.5	2

「不動産のための計量分析」レジュメ N0.7

クラス担当教員名※1	学部・学科名	学籍番号※2	氏名※2	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

まず、Ecoome_07_7をDLして、****data_05と名前を変えて各自のUF（ユーザーフォルダー）の計量分析の中にセーブしてください。****data_05のsheet name “コンビニの売り上げ”をアクティブにしてください。Excelのツールバーから分析ツールを選択し、メニューリストから回帰分析を選んでください

作業 1.. ****data_05 の sheet name “コンビニの売り上げ” を用いてコンビニの売り上げを、単回帰モデル（説明変数を店舗面積のみで行った場合と駅からの距離で行った場合の両方）と重回帰モデルを最小二乗法で推定してください。全部で3つありますので、結果を比較できるように横に並べて出力してください。詳しい操作の仕方は、下図をみよう。

図 5-2 Excel 分析ツール

①ここをクリックして被説明変数の範囲を指定してください。

②どうように説明変数の範囲を指定してください。

③先頭行がラベルの場合はここをクリック

④このシートに結果を出したいときは指定しましょう

⑤残差を出力しておくとな分析が楽です

図 5-3 Excel の重回帰分析結果

店舗	一日平均 売上高 万円	店舗面積 m ²	駅からの 距離 100m
	y	x1	x2
A	40	60	3
B	45	100	5
C	80	85	2
D	80	50	1
E	50	75	3
F	20	55	4
G	15	70	8
H	90	95	1
I	90	45	3
J	70	85	2

回帰統計	
重相関 R	0.485931
重決定 R ²	0.236129
補正 R ²	0.140645
標準誤差	23.2268
観測数	10

分散分析表					
	自由度	平方	分散	F	
回帰	1	1394.127	1394.127	2.472968	0.154464
残差	8	4315.873	539.4841		
合計	9	5709.999			

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	4.444444	29.88555	0.148716	0.885458	-64.4718	73.36064	-64.4718	73.36064
x1	0.650794	0.413942	1.572567	0.154464	-0.30053	1.605114	-0.30053	1.605114

残差出力		
観測値	予測値	残差
1	43.49206	-3.49206
2	69.52381	-24.52381
3	59.7619	20.2381
4	36.98413	23.01587
5	53.25397	-3.25397
6	40.2381	-20.2381
7	50	-35
8	66.26984	23.73016
9	33.73016	-3.73016
10	46.74603	23.25397

「不動産のための計量分析」レジュメ N0.7

クラス担当教員名※ ¹	学部・学科名	学籍番号※ ²	氏名※ ²	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

5.5 回帰分析の意味(ここは重要ですよ)

Excel の回帰分析ツールで出力される結果の読み方について確認しましょう。

回帰分析では、変数間にどんな関係があるかデータをもとに調べることができます。作業1では、「コンビニの一日平均売上高」と「店舗面積」および「駅からの距離」の関係を調べるために回帰式を推定しました。コンビニの立地計画をたてるには、「店舗面積」や「駅からの距離」が変化すると「コンビニの一日平均売上高」がどれだけ変わるか知る必要があります。ここで、「店舗面積」や「駅からの距離」を**説明変数**と言います。また、説明変数の変化による影響をみたい「コンビニの一日平均売上高」を**被説明変数**と呼びます。説明変数が1つだけの回帰分析を単回帰分析、説明変数が2つ以上ある回帰分析を重回帰分析と呼びます(注:ここでは定数項は数に入れていません)。以下、「コンビニの一日平均売上高」と「店舗面積」および「駅からの距離」の関係をみる重回帰分析を例としてみていきましょう。


それでは、Excel の回帰分析ツールの流れに沿って確認しましょう。まず、入力画面(「ツール」-「分析ツール」-「回帰分析」)に注目してください。次の2つの項目があります。

入力Y範囲

入力X範囲

入力X範囲には、説明変数のデータを選択します。入力Y範囲には、被説明変数のデータを選択します。作業1の重回帰モデルの場合には、入力X範囲には、「店舗面積」と「駅からの距離」のデータを選び、入力Y範囲には、「コンビニの一日平均売上高」のデータを選びました。なお、入力画面の「ラベル」がチェックされている場合には、Excel は、データの最初の行をデータではなく変数名として扱いますので、注意してください。入力画面を正しく設定すると、次の出力が出ます。

図 5-4 回帰分析の出力例



出力結果の読み方

①推計式のあてはまり

まず、点線1で囲った表をみてください。概要表はこの重回帰分析のあてはまりを検討しているところです。ここで、重要になるのは補正 R² と記してある、**自由度修正済み決定係数 \bar{R}^2** です。これはこの重回帰式の“あてはまり”を表していました。**自由度修正済み決定係数 \bar{R}^2** が0.9442064と1に近いですから、“あてはまり”は高いと言えます。

「不動産のための計量分析」レジュメ N0.7

クラス担当教員名※ ¹	学部・学科名	学籍番号※ ²	氏名※ ²	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

②説明変数の読み方

次に、波線²で囲った表を見てください（この出力は、見やすさを考えて小数点以下3桁まで表示させています）。この表は、次のように読みます。

回帰係数

まず、X1の行は、入力画面で入れた最初の（いちばん左側の列の）説明変数についての結果を示します。この課題の場合は、「店舗面積」でした。次に、X2の行は、2番目の説明変数について結果で、これは、「駅からの距離」を表しています。

表の中の「係数」に注目しましょう。これは、授業で習った**回帰係数**のことです。この意味を読み取りましょう。**まず、X1の係数(①のセル0.755)は、他の条件を一定とした場合に「店舗面積」を1単位増やすと「コンビニの一日平均売上高」が何単位変化するか**を示しています。ここでは、「コンビニの一日平均売上高」に影響を与える条件（説明変数）として「店舗面積」と「駅からの距離」だけを考えていますから、①のセルの係数は、「駅からの距離」を同じにして「店舗面積」だけを1単位増やした場合に、「コンビニの一日平均売上高」が何単位変化するかを示します。ここで1単位とは、計算に使ったデータの単位を示します。「コンビニの一日平均売上高の1単位は「1万円」、店舗面積の1単位は「1㎡」でした。回帰係数の数字は、0.755ですから、「店舗面積」が1㎡増えれば、「コンビニの一日平均売上高」は、0.755万円増えると読み取れます。

同じように、「店舗面積」を一定として「駅からの距離」だけを増やした場合の「コンビニの一日平均売上高」の変化は、X2の係数(②のセル)から読み取れます。この数字は、-13.078ですから、「駅からの距離」を1単位(100m)伸ばすと、売上高が13万780円減ることが分かります。このようにして回帰係数から読み取りますので、データの単位やオーダーはきちんと把握しておきましょう。

回帰係数の統計的意味

次に、上で見た関係が、統計的に意味があるか調べてみましょう。まず、「店舗面積」です。「店舗面積」が1㎡増えれば、「コンビニの一日平均売上高」は、0.755万円増えるという結果が出ましたが、これは、たまたまこのデータだけでみられた偶然の結果かも知れません。売上高のデータをとりなおせば、また違う結果が出るかも知れません。そこで、「店舗面積」と「コンビニの一日平均売上高」の間に本当に関係があるのか、統計的なチェックが必要なのです。これは、X1のt値を見ることでチェックできます。この値の絶対値が2をこえていれば、「店舗面積」と「コンビニの一日平均売上高」の間の関係が統計的に確認できたと考えます。この場合、「店舗面積」のt値は7.126ですから、余裕で2をこえています。このため、**「店舗面積」と「コンビニの一日平均売上高」には統計的に意味のある関係**があるといつてよいでしょう。

同様に、「駅からの距離」と「コンビニの一日平均売上高」の関係もチェックします。こちらのt値は、-10.781です。絶対値は10.781ですから、やはり、余裕で2をこえています。このため、「駅からの距離」と「コンビニの一日平均売上高」の間にも統計的に意味のある関係があるとと言えます。**一般に、t値の絶対値が2以上であれば回帰係数は有意である（その回帰係数は0ではない、すなわち、回帰式にその説明変数が必要である）と判断されます。**

この出力表に、下限95%、上限95%とありますが、これも参考になる指標です。例えば、「店舗面積」X1の回帰係数は0.755で、下限95%が0.504、上限95%が1.005となっています。これは、「店舗面積」X1の回帰係数が95%の確率で0.504から1.005の間にあることを示します。この範囲がゼロを含まないことから、回帰係数はゼロではない可能性が高く、これからも説明力の高さが分かります。

③観測データ別理論値と残差

最後に、残差出力表（一点波線で囲ってある部分）があります。これは、データ別に予測値（理論値）と残差が示されています。観測値と書いてあるのはここでは店舗番号です。基データの順番で店舗Aが1、店舗Bが2となっています。例えば、店舗Aでは、観測値が40万円で、理論値42.45万円ですから**残差（理論値－観測値）**が-2.45万円となります。この出力表では、個々の観測データを考慮して、追加すべき説明変数を検討したり、個々のデータの**異常性**を検討します。追って、これらを説明しますが、例えば観測値が10となっている店舗Iでは残差が大きくなっていますので、その原因を探る必要があるというような検討です。

作業2. rep_05をDLして、****rep_05と名前を変えて各自のUFの計量分析の中にセーブしてください。****rep_05に書いてある課題は、作業1の3つの回帰式の推定結果を使って答えてください。****は学籍番号。

『不動産のための計量分析』レジュメ NO.7

クラス担当教員名※ ¹	学部・学科名	学籍番号※ ²	氏名※ ²	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

さて、作業2までの分析で行ったことを式で確認しておきましょう。これまでの講義の学んだことがすべて出てきますので、わからないことはここでクリアにしておこう。作業1の重回帰分析では、次の回帰式を想定しています。

$$\text{(コンビニの一日平均売上高)} = \text{(切片)} + \text{(店舗面積の回帰係数)} \times \text{(店舗面積)} + \text{(駅からの距離の回帰係数)} \times \text{(駅からの距離)} + \text{誤差項} (\epsilon)$$

Excel は、入力したデータをもとに、上の式の(切片)、(店舗面積の回帰係数)、(駅からの距離の回帰係数)を**最小二乗法**という手法で計算し、出力してくれているのです。Excel が求めた値を代入すると、

$$\text{(コンビニの一日平均売上高)} = 36.412 + 0.755 \times \text{(店舗面積)} - 13.078 \times \text{(駅からの距離の回帰係数)} \times \text{(駅からの距離)} + \text{誤差項} (\epsilon)$$

となります。

回帰分析の出力結果の記述法

卒業論文などで回帰式の推計結果を報告する場合には、次のいずれかの形式にしてください。

◆**式形式**：式形式の場合には、推定した回帰係数を使って回帰式を書く。また、回帰係数の下には括弧書きで t 値を書き、回帰式の下に自由度修正済み決定係数、標準誤差、観測数などを書きます。式形式のメリットは、回帰式の構造を把握しやすいことであり、デメリットは、説明変数が多い場合や複数タイプのモデルを同時に書きにくいことです。

$$\begin{aligned} \text{(コンビニの一日平均売上高 (万円))} &= 36.412 + 0.755 \times \text{(店舗面積)} - 13.078 \times \text{(駅からの距離)} \\ &\quad (4.46) \quad (7.13) \quad (-10.78) \\ \hat{R}^2 &= 0.944 \quad \text{標準誤差} = 5.918 \quad \text{観測数} = 10 \end{aligned}$$

◆**表形式**：表形式の場合には、下表にあるように回帰係数ごとに推定値、t 値（標準誤差）を書きます。また、その下などに自由度修正済み決定係数、標準誤差、観測数などを書きます。表形式のメリットは、説明変数が多い場合や複数タイプのモデルを同時に記述できることであり、デメリットは式形式のように回帰式の構造を把握しやすくないということです。

表 5-2 コンビニの売り上げ推計結果 (万円)

	モデル1		
	回帰係数	標準誤差	t 値
定数項	36.412	8.172	4.46
店舗面積	0.755	0.106	7.13
駅からの距離	-13.078	1.213	-10.78
自由度修正済み決定係数	0.944		
標準誤差	5.918		
観測数	10		

説明変数は縦に書き足していきませ

複数のモデルは横書きで書き足しませ

回帰分析の応用

ここで、店舗面積 80 平方メートルのK店を駅から 300mの地点に出店したときの一日平均売上高を予測してみましょう。やり方は簡単で、店舗面積と駅からの距離 (100m 単位) を前のページの最後の式に入れるだけです。すると、コンビニ一日平均売上高は、

$$36.412 + 0.755 \times 80 - 13.078 \times 3 + \text{誤差項} (\epsilon)$$

となるのがわかります。問題は誤差項でこの大きさはわからないのですが、前回までのレジュメにある条件が満たされていれば、このお店の一日平均売上高の予測では、誤差項を無視してかまいません。このため、予測結果は、以下の値となります。(正確には、誤差項を無視して良いのは、一日平均売上高の平均値を予測する場合です。たとえば、一日平均売上高が毎月計算される値だとすると、その5年分の平均値を予測する場合です。ただし、このような込み入った話はこの授業の段階では考えないことにしましょう)

$$36.412 + 0.755 \times 80 - 13.078 \times 3 = 57.6 \text{ (万円)}$$

(やや上級の話)

『不動産のための計量分析』レジュメ N0.7

クラス担当教員名 ^{※1}	学部・学科名	学籍番号 ^{※2}	氏名 ^{※2}	提出日

※1:履修登録したクラスの担当教員名を書く ※2:学籍番号及び氏名が未記入のもの、また授業終了後に提出されたものは採点しないので、注意すること。

上で用いた回帰式は、説明のわかりやすさを考えてもっとも簡単な形にしてあります。このため、やや非現実的な特徴があります。まず、もともとの広さが 10 m²の店を 1 m²広げる場合も、200 m²の店を 1 m²広げる場合も、売り上げの増え方は同じ 0.755 万円と計算されています。また、駅前（駅からゼロ m）の店を 1 m²広げる場合も、駅から 1 km の店を 1 m²広げ場合も売り上げの増え方はやはり同じ 0.755 万円です。これは、ちょっと不自然な気もしますね。説明変数や被説明変数に変数変換をほどこしたり、回帰式の形を変えたりすることで、もっと現実的な結果を出すことができますようになります。これについては、次章で説明していきます。

作業 3. rep_06 を D L して、****rep_06 と名前を変えて各自の U F の計量分析の中にセーブしてください。****rep_06 にある応用問題は、作業 1 の重回帰分析の結果を使って答えてください。****は学籍番号。